



DT9209

CONSULTATION EN ORL

Attention : Consulter les alertes cliniques au verso et favoriser les protocoles de l'Accueil clinique (si disponibles) avant de remplir ce formulaire.

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| Nom et prénom de l'utilisateur | | | |
| N° d'assurance maladie | | Année | Mois |
| | | Expiration | |
| Nom et prénom du parent | | | |
| Ind. rég. | N° téléphone | Ind. rég. | N° téléphone (autre) |
| Adresse | | | |
| Code postal | | | |

| Raison de consultation | | Échelle de priorité clinique : A : ≤ 3 jrs B : ≤ 10 jrs C : ≤ 28 jrs D : ≤ 3 mois E : ≤ 12 mois | | | | |
|---|--|---|------------------|--|--|---|
| Otonéurologie | Surdit  <input type="checkbox"/> Neurosensorielle subite unilat rale <input type="checkbox"/> Avec retard de langage chez l'enfant <input type="checkbox"/>  valuation surdit  chronique <i>(Pr requis : audiogramme souhaitable)</i> | A | Rhinosinusologie |  pistaxis <input type="checkbox"/> R centes et s v res avec facteurs de risque (anticoagulation, an mie, etc.) | A | |
| | | D | | <input type="checkbox"/> R cidivante et chronique | D | |
| | | E | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Otites r cidivantes ou s rieuse persistante (depuis + 3 mois) chez l'enfant | D | | <input type="checkbox"/> Fracture nasale d plac e ► Si h matome septal voir alertes² | B | |
| | <input type="checkbox"/> Otite externe s v re qui ne r pond pas au traitement topique | B | | <input type="checkbox"/> Rhinosinusites chroniques ou sinusites   r p tition (+ de 3 par ann e) | E | |
| | <input type="checkbox"/> Acouph ne <i>(Pr requis : audiogramme souhaitable)</i> | E | | <input type="checkbox"/> Hypertrophie ad no-amygdalienne avec suspicion d'apn e du sommeil | D | |
| | <input type="checkbox"/> Perforation tympanique traumatique avec vertiges aigus | A | | <input type="checkbox"/> Hypertrophie ad no-amygdalienne | E | |
| | Vertiges <input type="checkbox"/> S v res, anormalement incapacitants avec examen neurologique normal <input type="checkbox"/> R cidivants ou dont l' volution sur plusieurs semaines est non favorable | C | | Autres | <input type="checkbox"/> Nodule thyro dien <i>(Pr requis : TSH et  cho souhaitable)</i> | D |
| | | D | | | <input type="checkbox"/> Dysphonie d'une dur e de plus de 3 semaines | C |
| | | B | | | <input type="checkbox"/> Masse cervicale suspecte | B |
| <input type="checkbox"/> Paralysie faciale p riph rique ► D buter st ro des oraux et antiviraux¹ | B | <input type="checkbox"/> L sion suspecte de la bouche ou du nez | B | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Dysphagie haute chronique | D | | | |
| Autre (utiliser cette section pour modifier une priorit  ou pour tout autre raison de consultation et justifier) : | | | | | Priorit  clinique | |
| Renseignements cliniques pertinents (joindre rapports, m dication, etc.) | | | | | | |
| Besoins sp ciaux : | | | | | | |
| Identification du m decin r f rent et du point de service | | | | Estampe | | |
| Nom du m decin r f rent | | | N  de permis | | | |
| Ind. r g. | N  de t l phone | N  de poste | Ind. r g. | N  de t l copieur | | |
| Nom du point de service | | | | | | |
| Signature | | | | Date (ann e, mois, jour) | | |
| M decin de famille : <input type="checkbox"/> Idem au m decin r f rent <input type="checkbox"/> Usager sans m decin de famille | | | | R f rence nominative (si requis) | | |
| Nom du m decin de famille | | | | Si vous d sirez une r f rence   un m decin ou   un point de service en particulier | | |
| Nom du point de service | | | | | | |

| Complétion du formulaire | |
|--|--|
| Identification de l'utilisateur | <ul style="list-style-type: none"> Inscrire le numéro de téléphone qui permettra au Centre de répartition des demandes de service (CRDS) de confirmer le rendez-vous (RV). Inscrire le code postal afin de permettre de donner un RV à proximité du domicile de l'utilisateur. |
| Raison de consultation | <ul style="list-style-type: none"> Cocher la raison de consultation. Sinon inscrire la raison de consultation non prévue au formulaire dans la case « Autre » et préciser la priorité clinique. |
| Priorité clinique | <ul style="list-style-type: none"> Justifier toute priorité clinique modifiée ou toute autre raison de consultation. <i>Permet au CRDS de connaître le délai maximal pour réaliser la consultation. Délai calculé en jours calendrier (inclus jours fériés et fins de semaine). Vous serez informé de toute priorité ne pouvant être respectée.</i> |
| Renseignements cliniques pertinents | <ul style="list-style-type: none"> Inscrire toutes les informations justifiant la priorité clinique ou sa modification. Acheminer au CRDS tous les prérequis (rapports ou analyses) nécessaires pour la consultation. Joindre la liste de médicaments. Besoins spéciaux : Inscrire les besoins particuliers tels que : interprète, déplacement en fauteuil roulant ou autre. |
| Identification du médecin référent et du point de service | Remplir cette section afin que le rapport de consultation vous soit acheminé au bon point de service. |
| Référence nominative | Il est possible que le délai ne soit pas respecté si le médecin demandé n'est pas disponible. Le CRDS communiquera alors avec vous afin de convenir d'une solution alternative. |
| Formulaire | <ul style="list-style-type: none"> Acheminer par télécopieur le formulaire à votre CRDS. Ne pas remettre de copie du formulaire à l'utilisateur. |

Légende

¹ **Pour les usagers de 16 ans ou plus présentant une paralysie faciale idiopathique depuis moins de 72 heures et sans contre-indication au traitement :**

Une corticothérapie orale est fortement recommandée. Un traitement de 50 mg de prednisone po die pour 10 jours constitue une thérapie valable. La prescription concomitante d'antiviraux demeure à la discrétion du clinicien. Cependant, la prescription d'antiviraux sans corticothérapie est déconseillée. Il est aussi recommandé de prescrire un lubrifiant oculaire de même que des larmes artificielle ainsi qu'une protection oculaire nocturne au besoin. (American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery).

² Si l'utilisateur présente une fracture nasale avec un hématome septal, diriger l'utilisateur vers l'urgence.

| Alertes cliniques (liste non exhaustive) |
|--|
| Communiquer avec l'ORL de garde ou diriger l'utilisateur à l'urgence |
| <ul style="list-style-type: none"> Épistaxis majeure non contrôlée Fracture du nez avec hématome septal² Abcès péri-amygdalien Otite externe avec sténose complète du conduit auditif externe ou cellulite |